

ТАБАК – ЭТО СМЕРТЬ



ОНКОЛОГИЯ

ПОВЫШЕННЫЙ РИСК
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ



СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПОВЫШЕННОЕ
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ,
ИНФАРКТ, ИНСУЛЬТ



ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ

ХРОНИЧЕСКАЯ
ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ
ЛЕГКИХ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ



ТРОМБЫ

ТРОМБООБРАЗОВАНИЕ
В СОСУДАХ



ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ




НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ

НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ПЛОДА ПРИ КУРЕНИИ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Табак - здоровью твоему враг.

Вред курения для подростков катастрофически велик, курение мешает росту организма. Например, формирование легких у ребенка анатомически завершается только к 12 годам. А физиологически и того позже — к 18, а у некоторых до 21 года. При курении в кровь ребенка поступает большое количество угарного газа, который вступает в контакт с гемоглобином. Из-за чего у всех органов и тканей наступает «удушье» — недостаток кислорода.



ЯДЫ ТАБАЧНОГО ДЫМА




5000
ЯДОВИТЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

Бензол, мышьяк, хром, никель
и другие канцерогены



60 МГ
НИКОТИНА

60 мг – СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА
НИКОТИНА, ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО
СОДЕРЖИТСЯ В 1 ПАЧКЕ СИГАРЕТ



ПОЛОНИЙ-210
СВИНЕЦ-210

В ЛЕГКИХ КУРИЛЬЩИКА
ОБНАРУЖИЛИ РАДИОАКТИВНЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ ПОЛОНИЯ И СВИНЦА



УГАРНЫЙ ГАЗ

ПРИ ПОПАДАНИИ В КРОВЬ НАДОЛГО
СВЯЗЫВАЕТСЯ С ГЕМОГЛОБИНОМ.
ЭТО ВЫЗЫВАЕТ КИСЛОРОДНОЕ
ГОЛОДАНИЕ

Курение для детей беда.

- Привычка курить особенно опасна для детей и подростков. Задержка роста, общего развития, снижение слуха, зрения, ряд нервных расстройств такова плата за детское и подростковое курение. Школьники курильщики, как правило, отличаются пониженными умственными способностями, слабо успевают, очень часто нарушают дисциплину. У подростков никотин поражает в первую очередь ещё неокрепшее нервную и сердечно-сосудистую системы.



Курение – это никотиновая зависимость

Как происходит формирование никотиновой зависимости? Сразу после вдыхания сигаретного дыма никотин из легких попадает в кровь и через 7 секунд достигает головного мозга, связываясь с никотиновыми рецепторами, что приводит к высвобождению дофамина – вещества, которое оказывает стимулирующее воздействие на центральную нервную систему и вызывает чувство удовольствия, продолжающееся несколько минут.



Никотин перестраивает биохимические процессы в головном мозге и постепенно курильщик привыкает к определенному его уровню в организме, возникает снижение чувствительности к эффекту вещества.

Минимальное количество никотина, способное вызвать нужный эффект, постепенно увеличивается. Срабатывает закон дозы: переход с меньших доз на большие. Таким образом, механизм формирования никотиновой зависимости представляет собой **порочный круг, из которого сложно выбраться**.

Курящая мать – больные дети


У курящей матери ребенок может родиться недоношенным, с пороками сердца, недоразвитым спинным мозгом и другими патологиями.

Дети чаще рождаются ослабленными, с низкой массой тела. Им требуется специальный уход и особая забота. Это связано с тем, что при курении мать и дитя испытывают «кислородное голодание», так как материнская кровь, поступающая в организм ребенка, недостаточно насыщена кислородом.



Чтобы не нанести вред здоровью будущего ребенка, **женщина должна не курить и избегать пассивного курения**.

При курении появляется желтовато-серый цвет кожи, увеличивается количество морщин, голос становится хриплым, на зубах появляются трещины и темный налет.



Пассивное курение – это вдыхание ядовитого дыма чужих сигарет

При пассивном курении человек вдыхает 70–80 % наиболее опасных компонентов табачного дыма. Пребывание в накуренном помещении в течение одного часа действует на человека как 4 сигареты, выкуренные одна за другой. Многим неприятно находиться в помещении, где сильно накурено, и ощущать, что волосы и одежда пропахли едким дымом сигарет. Это может вызывать тошноту. Если человек проводит много времени в прокуренных помещениях, у него могут развиться те же заболевания, что и у курильщика.



Согласно Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака» от 23.02.2013 г., **введен запрет на курение:**

- в закрытых помещениях госучреждений, на территориях образовательных и медицинских учреждений, стадионов, учреждений культуры, на вокзалах, аэропортах, на остановках общественного транспорта и перед входом в метро (не ближе 15 м), в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
- в гостиницах, ресторанах и барах, в поездах дальнего следования и на кораблях, на платформах железных дорог.